

資料來源：
陳真光醫生

二零二二年二月十九日

<2019 新冠肺炎注射疫苗事項問與答>

我們明白同業在為市民接種疫苗時往往遇到很多不同個案，並非政府宣傳海報可以解答。

我們綜合多位專家以及政府文件，為同業預備簡單問答撮要，希望增加同業執業時的信心及一致性。遇到有特殊個案作出挑戰可以以相關資料作為佐證支援。由於復必泰現時還是安排在注射中心，而他們有相關指引，本文件聚焦於科興疫苗處理。

(一) 如果打咗科興第一針，但已經超過四個星期，是否如常照打第二針？

對。無論已經逾期多久，第二針依然可以照常打。

(二) 如果打了復必泰第一針，但已經超過四個星期，想轉打科興，是否如常打第二針？

不建議。

無論第一針是科興還是復必泰，第二針須跟第一針一樣，而接種第二針必須超過四個星期才可以。但，若第一劑接種復必泰而出現明顯副作用(如心肌炎)或嚴重過敏，是可以轉打科興。

(三) 如果頭兩針是復必泰，第三針是否可以轉打科興？最少需要相隔幾耐？

暫時文獻多支持第三針使用復必泰，但也有持相反意見。

如果接種者依然選擇使用科興，是可以的，只要相隔六個月就可以。注意特定群組可以於第二針之後 28 日就可以打第三針。他們是免疫系統較弱的人，包括未受控的愛滋病患者，獲器官捐贈並且正接受免疫抑制治療、正接受透析治療患者。過去 12 個月接受化療治療或過去 6 個月接受過生物製劑或電療病人亦屬於這個特別考慮群組。

(四) 如果之前確診過新冠肺炎，打針安排有否改變？

有。

如果病人提及相關病史，就需要再上 VSS 網核對清楚。如果距離上次感染超過 180 日就可以打科興（超過 90 日，但又想打盡快接種多一針疫苗，可以接種復必泰）。

(五) 有「三高」是否可以打疫苗？

只要「三高」控制病情穩定，便可以。

香港人年過 40，很多都有「三高」問題，即血壓高，血糖高，血脂高。接種疫苗好處遠遠大於風險。如果病情穩定，還是強烈建議接種。如果病情未穩定，就盡快求診於家庭醫生，用幾天時間使用藥物控制病情，之後再接種疫苗。

根據衛生署指引，不接受醫學治療而長期病患未受控制，並不能屬於豁免群組。

(六) 如果病人在外地已經接種過疫苗超過四個星期，可以接種第二或第三劑嗎？

現時有超過七種不同的疫苗，例如 SinoVac, SinoPharm, BioNTech, Moderna, Janssen, AstraZeneca, Sputnik V 等等，相關指引在每一個地區也不停更新。

先要求病人提供接種紀錄，再上網查閱相關最新指引。如果並未能夠提供有關紀錄，暫時衛生署未有特定指引。平衡多種因素，一般來說，如果對上一針疫苗超過四個星期，可注射科興作第二針。如果超過 180 天，可以注射科興作第三針。

(七) 如果注射者有輕微上呼吸系統感染病徵，是否依舊安排注射疫苗？

必須先依照程序安排測試，確認是否新冠肺炎。

若確認是無症狀感染，那便要康復後一段時間才應接種，復必泰是三個月，科興是六個月。

至於在不知道隱性感染情況下接種，雖然沒有確實研究數據，但觀乎海外高病發地區，相信不少人士在接種疫苗時可能已帶有病毒。然而，接種疫苗的不良反應持續在非常低水平。

因此，總體而言，接種風險仍遠比感染風險為低。

參考資料

<https://www.covidvaccine.gov.hk/zh-HK/professional>

<https://www.chp.gov.hk/tc/r/966.html>

香港中華醫學會有限公司

本文件是與瑪嘉烈醫院醫院管理局傳染病中心兒科傳染病科關日華顧問醫生諮詢後編制的

二零二二年二月十九日